

痘疹世醫心法

痘疹心法序

隆慶紀元予轄楚藩以女病諸醫用藥皆不効聞羅田有萬生療小兒有神驗亟延至之命之診治女病果愈予政暇時時與萬生卮談乃萬生非如他醫但了一方一脉自售其術其爲業自素難下及近代醫書靡不究悉源委剖別是非又能溯諸六經性理根於吾儒之道信有本矣蓋萬生少嘗從事科舉以不得志而遂隱於醫宜其世之爲醫者不能望而及也

萬生著有痘疹心法一書予爲梓之俾表見於世以
予愛女求醫之心推言之則爲父母之保赤子者斯
心大略皆同而赤子之最難保莫過痘疹得是書審
察之劑量調攝之萬生之術溥而大行安謂其不得
志耶

淮海山人孫應鰲書

世醫心法敘

予嘗謂仁者以天地爲一體孔子之志在安老信
友懷少聖人豈能必天下無一物不得其所哉願
其心欲使天下物各得所苟可以安老信友懷少
聖人所必爲也此其心天地萬物一體之心也予
友父岡秦君新元初年子多痘疹不育後得楚黃
人黃廉痘疹書閱其實實虛虛之辨解毒補療之
法分門別症因病用藥井然有條因錄以歸遍授

諸兒醫多所全活已巳夏予守黃過梓里以書黃
本且素與予同志以其詳語予欲得原本廣傳斯
固仁人一體之念也予以郡事未逮今年夏

覲回得羅田萬全痘疹心法數卷即其書也較前
著更加詳焉予覽之果可察風氣洞病情胥視有
法藥療有方不直極濟童稚神而明之雖措之內
外科率是道也遂命梓而廣之徧授諸醫使因病
溯源隨方投劑海内生得其少而壯壯而老其意

補於世豈淺上哉予治黃踰二年即未能撫摩教
育悉除民苛毒出民疾苦得是盡而傳布之俾黃
少有長壯有養老有終以復於隆古之治則是刻
也所以體懷少之仁者在是而於夫子之教可撫
悖矣遂漫筆書之令業醫者知取衷云

歲癸酉秋九月黃守四明孫光祖書于懷古草堂

重刻痘疹心要序

蓋有不知而作者自用自專愚執甚為孔子表章六經垂憲萬世猶曰述而不作信而好古示不敢專以自用也予為孔子徒亦惟多聞多見擇而識之雖百家衆技之書可以利諸人者靡不玩索况醫術之仁為斯民立命者乎又乃先子專門之業所當繼述者乎竊思方脉之中保嬰最難嬰孺之疾痘疹最酷不敢自用自專考諸前言往行廣詢博訪不拘偏見迂說祇約於中間亦附以已意著為痘疹心要凡三易其初本擇為未精語為未詳意淺辭俚有好事者剽竊以為已述刻之南贛次乃改作

撫治鄖陽右中丞孫公淮海取其政本刻於行都司

黃州太守孫公懷堂又取鄖本刻之載歸四明其書旣出視初本
雖頗精詳然猶有未盡之證未立之法恐不足以活夭殤廣仁
愛垂久遠也於是補其闕略附以醫案屬望有力者鋟諸梓焉
庶天下後世之習幼科者無滄海遺珠之歎為得魚兔之筌蹄
云爾若夫不知而作者之罪予弗敢辭

痘疹心要改刻始末

一贛本痘疹骨髓賦及西江月乃嘉靖丙午丁未二年所作以教諸子故其意淺其辭俚使之易曉且易於記誦也

○其世醫心法歌括又嘉靖己酉庚戌二年所作欲以傳後未敢示人

○右前四年所作乃吾長男萬邦忠私授於喻朝憲憲授於王濂王濂得之以為已述刻於贛州軍門

一鄖本痘疹心法格致要論吾於嘉靖壬子癸丑二年所作其書雖成久藏於篋未敢示人恐為木災至隆慶己巳年

欽差撫治鄖陽等處右僉都御史孫 取而刻之於行都司臨刻

時予取骨髓賦改之曰碎金賦

一黃本乃隆慶辛未年

○黃州府太守孫 所刻與鄭本同重刻也

一今本吾因刻過世醫心法尚有未盡之證未立之法關略頗多未為全書况吾歷年已老嘗事且久故取其往日所治之證經驗之法因案以立括因括以附案補其關略凡百餘條非曰盡之如有未備者以俟後之君子

卷八

瘡疹碎金賦 二篇

一卷

治痘總括 凡一十八首

二卷

發執證治歌括 凡一十九首

三卷

出見證治歌括 凡二十二首

四卷

起發證治歌括 凡三十五首

五卷

成實證治歌括

凡三十四首

六卷

收歷證治歌括

凡一十九首

七卷

落痢證治歌括

凡一十一首

八卷

痘後餘毒證治歌括

凡三十六首

九卷

疹毒證治歌括

凡二十六首

十卷

婦女瘡疹證治歌括

凡一十二首

十一卷

古今經驗諸方

凡八十五方

十二卷

古今經驗諸方

凡六十一方

目錄畢

格致要論目錄

一卷

原痘論

胎毒論

瘡疹惟腎無候論

腎主痘中之水論

痘疹五臟證見論

臟腑主證治

六氣十二經所主證治

二卷

氣運

痄腮

部位

脉候

氣血

陰陽

標本

形色

疎密

輕重

順逆

痘有恠變

虛實

動靜

痛痒

老嫩

荣枯

善惡

始終

三卷

發熱

渴

腰痛

腹痛

驚狂

譫妄

吐利

嘔吐噦

洩利

大小便

咳嗽

喘急

自汗

失血

煩躁

夾疹

夾癰

痘疔

痘癰

痒痛

陷伏

壅腫

潰爛

厥逆

寒熱咬牙

暴啞失聲

噎水吐食

四卷

驗頭面

驗耳目鼻

驗口牙齒

驗喉舌

驗頭項

驗咽喉

驗手足

驗寢卧

驗飲食

五卷

治痘要略

攻補利害

巫醫得失

雜證宜攻

壞病不治

飲食所禁

異氣所害

起發不透

收靨不齊

差後餘證

痘後餘毒

六卷

瘡疹證似傷寒辨

痘瘡首尾不可汗下辨

痘瘡不可以日期論辨

大人小兒富貴貧賤不同辨

升麻葛根湯辨

瘡疹順逆辨

瘡疹變黑歸腎辨

痘瘡變黑有順逆辨

諸痛痒瘡皆屬於心辨

過飲冷水變生諸證辨

錢氏陳氏立法用藥同異辨

補脾土瀉腎水辨

瀉膿血茄皮水穀辨

斑疹論

五行生死論

七卷

先哲格言

凡一十八家

八卷

或問

凡三十七問

九卷

治痘凡例

凡四十三條

十卷

藥性主治及修製法

氣類

凡四十五品

血類

凡十七品

十一卷

藥性主治及修製法

解毒類

凡六十八品

金賦一

痘本胎毒俗曰天瘡雖厲氣之傳染實殺機之顯彰變遷莫測酷
惡難當肌肉潰脫若蛇蛻皮龍蛻骨精神困頓若如虱在灰
蟻在湯瘡有疎密若疎者輕而密者重毒有微甚若微則祥而
甚則殃笑彼拘於日數者未達遲速之變悲夫惑於鬼神者不
求醫藥之良

乾坤妙合震巽分張受氣於父方得陽精而凝結成形於母方賴
陰血以培養民多嗜慾氣匪淳醴滯火熾於衽席食穢蓄於膏
梁精血稟其毒氣若甚於射罔形體負其殺氣若險於鋒鏃或
謂去其口血方不過脫空之語或謂解其胎毒方未見抵聖之

五運統於南北方有太有少六氣分於主客方曰陰曰陽變化各正勝復靡常得其序而氣治方國無疢癘失其序而氣亂方民有疹瘍應至而不至方其氣徐貴迎之以奪其勢未應至而至方其氣暴姑持之以避其強不知此而妄作方違時者敗能審此而慎動方順天者昌

春令溫和而升生夏令暑熱而浮長秋令清涼而降收冬令寒冽而沉藏是得四時之正不為萬物之傷冬反煥煖方勾萌早發春反栗烈方蟄虫且藏夏反清肅方涼風襲肉秋反蒸溽方暑汗沾裳若此逆氣方染之者即成疫癘又有虛風方中之者必致天傷

受父母之穢毒方隱於黝僻觸天地之瘴氣方發其犬豕豺狼內而
出兮布於四體自外而散兮根於五臟肝主淚而為水肺主
涕而作膿囊心則斑而且赤脾則疹而又黃腎乃封藏之本變
則黑陷之象可害者萌而秀秀而實如鳥之脫距所惡者枯而
陷陷而伏如虎之負隅

東赤南白西黃北黑各分布而有定春生夏長秋收冬藏自流行
而無疆初出血點方紅鮮得生之氣次化水液方白瑩漸長之
狀膿成而色黃方歛收之候疔結而色黑方已藏之象謂腎無
證者似去冬不能成歲謂黑為逆者如癰疽何以調陽
方其發生方春夏為順而秋冬非吉及其收歛方秋冬為順而春

夏不臧應發生而反收斂者謂之陷伏應收斂而反發生者謂之爛洋順者不必治方待其平復逆者不可治方避其怨謗若逢險謐必在奇方治不乖方方險變順而春回幽谷藥不對病方險變逆而火烈崑岡

病似順而反逆方認之要慎病似逆而反順方察之貴詳似粟堆聚堅硬方孰若磊落而稠密如丹艸赤嬌嫩方不如淡白而老蒼初出現而函水乍起發而戴漿膿未成而乾黑囊未滿而萎黃早發先萎方如園林之花葉暴長遽消方似清澗之潦潢是謂斂命之謐休誇折肱之良

輕或變重方誤服藥而或犯禁忌重或變輕方得過醫而凡特謂

卷之五
班夾疹疹班方不旋踵而告變蛇皮豕殼方惟束手以待亡班
病揮霍最宜用藥審詳病有標本方視急緩以立法藥有補瀉
方因虛實而立方

憲嘻方醫無定法迷亂方藥無定方大率賤攻而貴補故多喜溫
而惡涼設若病遇虛寒方溫補有效假如溢屬實熱方辛香敗
嘗辛熱下咽陽之盛者必困苦寒入胃陰之盛者乃戕戒汗下
於首尾方惡攻之說補脾土以制腎水方喜補之常不識補者
之短奚論攻者之長

形尖圓而光壯方氣之充拓色鮮明而潤澤方血之涵養可以勿

藥是謂無恙灰白平陷方氣血虛而補之以溫紅艷掀腫方氣
血熱而瀉之以涼氣至而血不足方雖起發根窠不肥血至而
氣不足方雖明潤郭郭不長泥章句以舉一隅者守株安可得
兔馳辨說而執兩端者多岐必然亡羊

脾為水穀之本固不可以不補腎為津液之源尤不可以不恃土
雖為水之坊水能制火之亢腎主骨髓方倒陷入於骨髓者莫
救腎司閉藏方變黑至於閉藏者可防是皆歸腎之害豈可謂
腎之強毒火燔灼方腎水且涸營氣敗壞方脾土亦傷故補腎
不如救腎而養陰所以濟陽

良則氣血淖澤而不欬寒則氣血凝泣而不章氣血失養症多矣

傷或受於熱方為煩躁為赤為痛或受於寒方為脹滿為白為
痺順時令之寒暄禁人畜之來往勿動涓刻之氣勿燒極癆之
香恐乘虛而易入反助毒以為殃痘雖吉而犯多凶屢經恆變
證雖惡而調則善終見安康

若夫瘡疹之熱相似內外之傷邪火烜赫方玉石俱焚真水靜順
方波浪不揚噴嚏咳嗽方肺金流鑠項急頓悶方肝木披剝呵
欠驚悸方心雖君主而不寧吐瀉昏睡方脾則倉廩而不藏各
臟有證惟腎無象不受穢毒之火獨見耳聾之涼

熱微方毒少熱甚方火旺大熱安靜方毒隨熱出而無慮小熱煩
躁方毒與熱留而可防凶災莫測方又熱又渴輕疎可許方乍

執乍涼吐瀉勿止方使毒得越而無遏驚悸不定方恐毒深入而反藏血妄泄於空竅方死期速於彈指語妄涉於鬼神方變紙劫於返掌

形證定其疎密部位決其存亡如豆紛布方且顆粒而其疎已定如麻堆聚方更模糊而其密堪傷挨頰颯口方庚戌陽明之注額間額上方壬丙太陽之鄉頭為元首之導最怕蒙頭項乃關津之要偏燃鎖項鼻準初出方淫毒犯於天根耳輪先現方星火侵乎玉堂

漸次出方吉兆瘰癧出方凶狀痘將出而熱減方瘰癧勿妄服痘正出而熱劇方醫宜早防解其火毒方恐轉遏而乾枯其候

欲流行而舒暢遠寒熱之化兮損之益之而必使和平
夏之令兮達之發之而必使長旺治其未亂兮徹桑土於迨雨
知其必漸兮戒堅冰於履霜

出欲盡而不留發欲透而無長苗漸成繁兮氣之所向血漸化水
方血之所養疎則毒少兮頭面不腫而休怕密則毒多兮氣血
不充而莫荒時日既足兮自翹翹而雜起表裏無邪兮勿汲汲
以作湯所謂良將用兵善攻不如善守又云上農治田勿助生
於勿忘

咽喉急痛兮勿遽時而早治頭面預腫兮但引日以必亡小便赤
清兮大便秘却欲其堅實淡味可食兮厚味不可以啖譬如淡者

胃氣不損養厚之久邪益亢或見黑點兮點之速以臙脂或遇
乾枯兮浴之貴以水楊瘡痒忽生兮取茵陳以熏燎爬搔不寧
兮雖虛痛而徬徨

渴長滿水毒化成漿愛其稠濃兮惡其清淡取其滿足兮舍其虛
洋欲知透真不透兮於手足而細察欲知足與不足兮於輔頰
以端詳設四末之未透取脾胃而服藥如一方之未足視經絡
以求方譬如為山兮勿功虧於簣土又如執熱兮寧濯先於探湯
面頰最嫌破頂肩背尤怕焦囊腫忽消兮氣脫語忽妄兮神亡食
穀則嘔兮胃爛飲水則嗆兮咽傷咬牙兮肝火熾而腎敗寒戰
兮陽氣弱而陰強膿反乾兮倒陷膿不成兮伏藏吐衄不止兮

毒攻腸胃悶亂不寧兮火烈南宮倉廩不藏兮魂魄歸於冥冥
水泉不止兮姻親泣於北邙

膿血已化收醫相當兆自唇吻兮凝吐結如珠粒斷自人中兮部分
默以意望令行秋冬兮依先後而不亂氣應陰陽兮循上下而
有常類上平乾兮愿乎倒醫類間先收兮謂之不祥痂不著而
壅腫兮由榮血之淖溢瘡盡裂而皺揭兮此衛氣之殘傷

當醫不醫當藏不藏便秘未通兮裏氣熱而涼導使澹不實兮中
氣虛而溫養熱傷皮毛兮恠肺金不收餘氣濕傷肌肉兮責脾
土不燥殘漿頭瘡堆膿不平兮孤陽似燄而不生足瘡包水不
乾兮純陰如冢而不長飲食減少兮迤邐引日而斃煩熱增劇

今倏忽絕命而亡

若問痂皮之不脫其間病氣之相妨痘若敗壞今補空痘勿疑番
次瘡如潰爛今成潰瘡莫厭膿漿遍身浸淫今粘被席而最苦
正面腫灌今息腥臭而再妨利多水液今此蓄水之病也水去
盡而自止便多膿血今此倒靨之證也膿去盡而可詳瘰癧凹
凸今陷者虛而突者實痂皮嫩薄今裏則困而外則瘍

邪氣盡而正復痂皮脫而身康苟幼軀之多病定餘毒之有藏出
或未盡今無空痘須防卒暴發或未透今無潰膿必發疽瘍不
及期今早收毒火陷而可怕或過期今不靨邪氣留而堪悵身
熱審其虛羸咽腫觀乎嘔哈忽洒浙而肌熱今知風寒之外感

是吐瀉而腹痛兮必飲食之內傷

病有苦而眩暈兮凶多吉少之占身無邪而昏瞶兮否夫泰來之
象聲音不出兮求諸肺腎之經非疹復現兮責其心脾之臟非
衄出血者難治洞泄完穀者莫講勿謂痘收而縱馳勿謂毒去
而怠遑正氣浸長而未復邪氣方消而未央特犯禁忌兮今卽
生變恣食肥甘兮後必有殃

疥癩癰潰兮一面黥瘢而似鬼癰疽流注兮四肢殘廢而如眚目
腫赤痛兮冷疽入而成醫齒宜黑爛兮熱毒浸而潰牀雖曰餘
毒之為害抑若定數之莫防形容頓改兮令人駭愕調治悔遲
兮空自惆悵謂人不能勝天兮何以立乎醫藥謂醫不如用巫

今安能格乎穹蒼

但逢出痘之歲多求解毒之方重者必輕今輕者不出凶者變吉
今吉者何妨其方則有其效未嘗與其先事而輕妄執若臨時
以消詳審歲氣之變祥今必解其鬱視形氣之勇怯今各平其
臟欲避厲氣傳染今必先得地之善欲仗藥力調護今尤要識
醫之良

惺惺參蘇乃養散之妙劑

惺惺散參蘇散

人參通聖誠疫癘之奇

方

人參敗毒散防風通聖

熱而驚悸今導赤瀉青合用

導赤散

瀉青丸

熱而焦渴今柴胡葛根作湯

小柴胡湯升麻葛根湯

自

利分黃芩

黃芩芍藥湯

不便今清涼

四順清涼散

腹痛毒攻今

勻氣散再加枳實腰疼病劇今敗毒散更入木香調元可補今

表裏實者勿飲調元湯承氣可攻今脾胃弱者莫小承氣湯

養正今黃耆人參甘草解毒今連翹山豆牛旁咽喉苦痛今井枯

湯中加大力斑疹夾出今防風散內去硝黃防風通聖散小便

赤澁今連翹道赤連翹飲導赤散大便滑洩今豆蔻木香豆蔻

丸木香散瘡若乾枯今四物合平涼膈四物湯東垣涼膈散痘

如黑陷今奪命助以水楊奪命丹水楊浴法赤艷掀腫今解毒

入生黃歸芍黃連解毒湯灰白平塌今異攻用桂枝蓄防錢氏

異攻散

氣虛而毒盛者無價四君子湯無價散四君子湯血虛而毒盛者

無價四物牛旁

四物湯

氣血兩虛今十全無價

十全大補湯便

溺俱阻今八正三黃

八正散三黃丸

再用膽毒之法以洩毒氣

之藏黑陷審其虛實虛者大補而實者涼膈

十全大補湯河潤

涼膈散

痺癰分其急緩急者異攻而緩者調陽

陳氏異攻散

元即調元湯

昏悶諸妄今龍腦膏孰知其妙虛煩迷亂今抱龍

丸莫及其良

滿面燥痛今百花調水

百花膏

遍身潰爛今敗草鋪牀

敗草散蟬

蛇去目中之屑翳

蟬蛇散

苦參治身上之淫瘡

苦參丸

虛熱多

汗今調元湯引用浮麥食積常痛今脾積丸飲以原湯飢不喜

今異攻宜父

錢氏異攻散

渴欲飲水今白朮可常

白朮散

毒通聖允矣衝陣之先鋒

人參敗毒散防風通聖散

調元異攻

信乎殿後之大將

調元湯錢氏異攻散

大抵醫要識證藥不執方專科溫補者則宗乎文中喜用原瀉者則師乎仲陽不辭其書分似贅寔行於谿徑未會其神分如矯仰望乎宮牆嘆吾年之老兮歆深造而力不足惧斯道之晦兮特發明而言不章嘔盡心肺兮非歆立異勞費頰舌兮豈敢恃長幸取正於具眼徒見咲於大方

金賦二

乎君火氣本少陰傳於其子今故為脾胃之証乘於其妻今現
乎皮毛之分亦胎毒之所發因疫癘而後成咳嗽噴嚏今辛金
煉於丁火頓悶泣出今君主御乎將軍迎而奪之今其絳易挫
隨而擊之今其銳難勝如折勾萌今斧斤不用苟待燎原今王
石俱焚

其色如斑今摸之有迹其形似痘今視之無津朝出暮收今發之
於陽暮出朝收今發之於陰變化莫測出沒靡定大抵愛赤而
惡黑治者喜涼而忌溫赤如點朱今火明彰顯之象黑如灑墨
今火燄曠昧之甚制以酸涼今收炎光於麗澤投以辛熱今縱

赫曦於重明

敗毒防風開發斬關之將

人參敗毒散防風通聖散

解毒連翹制

伏降虜之兵

黃連解毒湯連翹散

如錦爛熳兮服化斑而艷歛

化斑湯

以火熏蒸兮飲涼膈而熱清

東垣涼膈散

咽痛兮甘桔

牛旁止咳嗽更能潤肺

甘桔湯

溺澀兮導赤為藥定驚悸又可

涼心

導赤散一名火府湯

便秘兮承氣膽導

調元承氣湯胆導法

便洩兮黃芩猪苓

黃芩為藥湯猪苓湯

大渴兮膈焦置瓜瓠於

白虎

白虎湯

苦煩兮裏熱加山梔於安神

安神丸

無伐天和兮

使陰陽之適調勿犯胃氣兮雖攻補之不盡

痘欲盡發而不晉疹欲盡出而無病或邪氣之鬱遏兮留而不去

或正氣之損傷兮因而未伸毒歸五臟變有四證毒歸脾胃今
泄瀉不止而變痢毒歸心肝今煩熱不退而發驚咳嗽久而血
出今毒歸於肺牙齒爛而疳蝕今毒歸於腎輕者從制以嚮善
平之有功重者拒敵而肆惡攻之不勝

熱不除者調元湯加麥冬知母作箇兮兼以抱龍溫驚

九錢氏溫驚丸

咳不止者阿膠散

小阿膠散

加杏仁惡實帶血

兮專以補肺太平

錢氏補肺阿膠散十藥神書太平丸

注下兮

異攻猪苓澤瀉

錢氏異攻散

震滑者大作參苓

參苓白朮散滯

下兮異攻當歸芍藥休息者少與真人

真人養臟湯

惟有牙疳

之病原呼走馬之名初息臭而腐肉漸血出而穿齦內服地黃

今制其火性地黃丸外擦蚊合今殺其蠶精蚊合散牙若脫落

今崩砂之狀可畏聲若啞頃兮狐惑之證難明

應出不出兮發之初惺惺次通聖奪命大發而有準惺惺散防風

通聖散奪命丹應收不收兮解之初葛根次化斑涼膈大解而

最靈升麻葛根湯化斑湯河澗涼膈散色淡白兮為虛四物去

川芎加紅花桂枝四物湯色紫黑兮血熱化斑去人參加玄參

燒糞化斑湯奪命發斑疹之聖奪命丹無價解疫癘之神無價散

發不出而煩躁兮虞不能膿黑不變而譖妄兮食不及新熟蒸

蒸兮色赤痢滴滴兮氣腥羸瘦骨肉之脫癢癢神識之昏喘急

今胸高有聳痺爛兮漏腮缺唇休訴三世之妙手難留一息之

遊魂

豈不聞誤服湯丸兮不如勿藥又不見特犯禁忌兮可以自省愛
吃鹹酸兮咳嗽連綿而未已喜啖辛燥兮火熱燔灼而不寧甘
甜過而齒齲生冷多而糞清惡則生風之畜魚則動火之鱗鰕
魚食而亂食風火併而啓鬱邪又滋甚兮為斑疹而不息毒反
深入兮值疫癘而再經斯則疹之遺毒亦若疽之餘證

欲決內傷須詳外證目常赤痛兮青童抱火鼻常鼽衄兮素女卧
薪病牙齒以終身兮玄武困於湯鑊發癩癰而連年兮朱雀驚
於燒林洩數短澁兮乃州都之遭火便溲垢壅兮必倉廩之被
焚哮喘炎上之象丹瘤赤瘰之形唇舌多瘡兮門戶殘煙未熄

咽喉常腫兮管籥餘燼猶存苟求其故兮則一言之可盡歆撫
其本兮豈一旦之能平噫此賦之作效蛙之鳴詞雖鄙俚兮積
如累石法則珍秘兮故曰碎金

嘉靖丙午予嘗手作小兒及痘疹賦西江月以教豚犬至己
酉冬又著痘疹心要久藏於家不知有交相傳錄者更剽竊
為已作刊之彼時見亦未定信筆草草安可示人今特改正
以補前之罅漏耳

隆慶戊辰秋九月全自述

碎金賦畢

痘疹世醫心法卷之一

羅田 密齋 萬全 集

○痘疹節要總括論

治痘節要諸家論之已詳大抵臨病應變因時制宜其用歸於使人正氣不損邪氣得釋而已後世不知古人制方一以中和為貴曲學偏見滯於一隅喜行溫補者既昧乎解毒之巧專用涼瀉者又失其和中之旨妄投湯餌僥倖成功設遇脉證乖常時勢差異惟束手待斃焉耳况虛虛實實令人夭折者又紛然乎其間哉予因此懼乃蒐輯往哲診治之法及先君經驗之方彙成歌括凡百九十四首序次成書庶臨病之工閱而取之參詳

審謗斟酌施治以收十全之功幸無得魚而忘筌也

○治痘總括 凡一十九首

痘疹原因胎毒成

發生須是行天行

如逢疫癘將成候

預解湯丸最可憑

痘疹之病皆由父母胎毒蓄於命門之中命門者右腎相火也為人身生化之本故毒藏焉如遇冬令溫和陽氣暴洩人則感之觸動相火至春夏生長之時其毒適發傳染相似是謂天行疫癘也未出痘疹者但覺冬溫即當預防宜服解毒之藥如辰砂散 八十七

消毒保嬰丹

十一

代天宣化丸

十二

皆可用也頻頻與之使瘡疹

之毒輕減自然易出易收無陷伏轉遏留連之患其辰砂散消毒

升代天宣化丸以解時行痧瀉之毒則可或因父母精血不足者或其人素有他疾者或發熱之時別臟形證發見者並宜煎而治之不可徒恃解毒而竟忘其本也

如脾胃素弱者宜以養脾為重解毒次之養脾丸 一百六服三之

二解毒三之一

如因父母奉養過厚精血畜毒素多胎病者宜二毒併解以溯源解毒湯 一百八 代天宣化丸 十二 相間服之

吾邑黃鳳山為陳留縣丞時得生一子及歸甫五歲邑中出痘乃請予託以預解痘毒之法予曰觀令嗣氣色明潤胎稟壯實痘出必疎若更服解毒之藥則益疎矣乃與代天宣化丸服之

後果輕疎未藥而安

未病先知是上工

能言輕重吉和凶

不離氣色分清濁

臟腑精微阿睹中

經云上工治未病者或望而知之或聞而知之或問而知之或切
脉而知之是謂神聖工巧瘡疹之毒發於五臟而心主之故曰諸
痛痒瘡皆屬於心心之華在面吉凶輕重可望見其氣色之清濁
而知之○如青氣見者此肝之色肝木生心火為實邪宜先瀉肝
羌活湯主之十○如赤氣見者此心本經之色為正邪宜瀉心導
赤散主之三十五○如黃紅氣見口唇燥者此脾之形色心火生
脾土為虛邪宜先瀉脾瀉黃散主之一百九弄舌者亦脾熱以導

赤散瀉黃散合治之如白色見帶燥鼻中乾或清涕出者此肺之
色心火尅肺金宜瀉肺中之火邪瀉白散

五十四

加黃芩山梔仁

天花粉桔梗主之

如黑氣色見者此腎之真臟色見水尅火為賊邪不治

卷之

預知瘡疹吉凶機

氣色都於面部推

卷之

年上山根尤緊要

紅光可喜黯青疑

五臟皆屬於面左頰為肝右頰為肺額上為心頰為腎鼻為脾又
目為肝之竅鼻為肺之竅口為脾之竅耳為腎之竅舌為心之苗
若未出瘡疹之先面部諸位明潤者吉暗燥者凶又相書分山根
為命宮年上管疾厄若二宮紅黃尤晶者吉青黑昏暗者凶故二處

尤緊要也

○凡天行痘疹之時傳染流布男女大小有未出痘疹者視其形色情性可以預言輕重吉凶也此吾家傳秘訣賢於命卜遠矣蓋五臟精華皆見於面而臟氣獨盛者色亦應之故肝氣盛者色青心氣盛者色赤脾氣盛者色黃肺氣盛者色白腎氣盛者色黑但欲明潤不欲枯槁吉凶之兆於此決矣

一觀其色紅白明潤與平日同無改變者吉如紅赤而太嬌眊白而無采頰然改變異於平時者凶又如額有青紋目有赤脉口有黑氣耳有塵痕者大凶之兆也

二觀其形精神爽暢動止便利言語清亮者無病也吉如精神衰

弱動止遲留言語低微異如平時者凶又原具壽相者吉如痘
天相頭破顙解項小不能任元脚細不能任身目無精采或睛
露神啼聲斷續笑語無情不由喜引自笑語也聰慧太早肉浮
骨軟者凶之兆也

二觀其情性未發熱時忽生喜心若與父母愛戀不忍捨者及聞
見怪異言語妄誕者凶之兆也

吾邑大尹雲閣朱公義男一子甫周歲尹心愛之問全曰此子
可養全曰其笑無情恐出痘耳尹問何謂全曰訣云喜引繞方
笑此子不待喜引自笑謂之無情笑者心之聲火之象也經曰
諸痛痒瘡瘍皆屬心火故恐出痘也尹疑之次年果出痘頭面

預腫癢痒而死尹謂全曰爾言驗矣

吾友胡三溪中年再生一子項小聲小託吾調理予告之曰項者頭之莖也名曰天柱項不任元天柱頹矣聲者氣之養也聲微不揚元氣弱也誠恐出痘不勝其毒果九歲出痘乍見乍隱鼻中滴血而卒

邑人李新芳長子方四歲得驚風請吾醫治得愈乃曰吾兒託在門下賴得保全愚夫婦之幸也敢不厚報予曰令嗣胎稟怯弱精神短少若調理數年胃氣充實出痘無妨但恐來得太急也次年果出痘稠密不能成膿而卒

吾邑周柳溪惟一子五歲未出痘癸丑正月二十三日然熱甚

予視之見其面上多青黑氣色目視無神元氣怯弱予告之曰
當亟治之彼不喜吾言反詰予曰不亟治若何予曰邪氣有餘
正氣不足若不亟治後發血泡不可為也彼更請醫張鵬作外
感治且汗且下至二十八日果發血泡而卒柳溪今猶無子惜
哉

蘄水縣金谷山周惠長男婦魯氏新寡二男二女皆未出痘聞
吾在周望峯家醫痘因其父魯希賢嘗有舊好時在女家請予
視其男女以決痘之輕重予往觀之見其二男長女面色雖嬌
赤光太露頗有青紋惟小女形實氣充面色明瑩乃告之曰幸
無出痘惟小女吉也可預解之魯恠太直不聽預解之說半

後長女二男相繼死於痘厄小女獨存

蘄水縣徐長溪生三子癸丑春出痘季子先病痘卒次子又卒
惟長子存亟請吾往治之時未發熱吾觀長溪其色甚憂其情
甚苦蓋在危險中無可為解救者觀其長男而告之曰令嗣當
出痘之時精神奕健氣色光晶年壽明潤印堂黃光此乃壽相
又順候也其痘必疎不須醫治勿疑慮也數日後果發熱出痘
甚疎未曾服藥而安長溪謝曰先生預料之神敢忘厚報

發散為陽收斂陰

始終一氣自流形

試觀春夏多蕃秀

纔到秋冬少發榮

嘗論痘瘡之證乃人身中一陽之氣始於發生終於收斂流行遞

變以至於盡譬諸草木春生夏長秋實冬藏皆此一陽之氣自為
始終者也故治疸者先要識得此氣其來不可禦其序不可紊盡
其裁成輔相之道以左右民然後謂之良醫也所謂道者明於陰
陽和於術數也蓋天

辛甘酸苦

故溫熱為陽而寒涼為陰地有陰陽故

辛甘為陽而酸苦鹹為陰一物之中亦有陰陽故氣薄者陽中之
陽厚者陽中之陰味薄者陰中之陽厚者陰中之陰清陽升浮榮
腠理而實四肢濁陰降沉走五臟而歸六腑所謂明於陰陽者此
也至於立方之旨如辛甘發散為陽則用辛涼甘寒之劑味雖陽
而氣則陰也酸苦湧泄為陰則用酸熱苦溫之劑味雖陰而氣則

陽也氣味相和陰陽相濟必使陽毒之氣順其流行之勢而不失其運變之序始於春夏終於秋冬所謂和於術數者此也今之醫症者辛甘溫熱之群聚偏於陽而不知濟之以陰酸苦寒涼之合同偏於陰而不知濟之以陽使痘毒之氣有春無秋有冬無夏是皆昧於陰陽之理不知術數之奧以天人命醫云乎哉

首尾汗下調不宜

尋常執着豈通醫

若分虛實能權變

可奪乾坤造化機

首尾不可汗下古人必不所為而發今徒拘執不可汗下之言設遇外感寒邪腠理閉密者其出不快其發不透不與辛甘發散之劑寧無壅遏之患乎又如大小便秘結者不與苦寒洩利之劑寧

無脹滿煩躁乎但察其虛實氣結權亦可汗即汗可下即下中病則已勿過其制然後謂之通醫

吾縣學訓導馬公順蜀人也一孫男五歲出痘至八九日膿成將靨時忽腹中痛煩躁叫哭大便秘舉家驚惶予曰莫憂此結糞也當急下之馬公曰痘瘡首尾不可下今當收靨中氣要實豈敢下耶予思若不急下轉加腹脹氣喘悶亂則不救矣乃作桂枝湯暗入酒蒸大黃煎服後取下燥糞腹痛即止痘亦收靨而安馬公知之謝曰非子通變幾誤此孫

痘瘡無病勿服藥

實實虛虛不可錯

幾多狂瞽昧經文

壁中安鼠翻成惡

痘瘡一科自始至終如無病者不可服藥古人云無病服藥如壁中安鼠誠確論也蓋治病之工只有補瀉二法果虛而補之可也若元氣素厚穀氣素強者而復補之則有實實之變果實而瀉之可也若元氣素薄穀氣素弱者而復瀉之則有虛虛之變如此之類豈不為壁中安鼠者乎今之業醫者但思醫不用藥何以為功而取利也不論虛實妄投藥餌幸而中病則大言以彰其功一有誤焉則掩飾其過而推託於命矣

瘡疹傷寒疑似間

古人分證可相參

莫將汗劑先輕試

發散惟令表裏安

瘡疹發熱與傷寒相似但傷寒只見一經形證若痘瘡則五臟之

證皆見如呵欠頰悶肝證也乍涼乍熱手足稍冷多睡脾證也
燥腮赤咳嗽噴嚏肺證也驚悸心證也眩涼耳涼腎之平證也如
初發熱疑似之時不可遽用發汗之劑如麻黃桂枝湯類蓋瘡疹
表裏俱熱苟輕發汗則腠理開張表氣益虛臟腑陽盛其熱轉增
但以升麻葛根湯一人參敗毒散二羌活湯十參蘇飲三之屬解
之使表裏氣和

凡瘡疹五臟見證要察何臟之證惟甚即主其臟之毒多○如肝
證毒多者必發水泡生癢痒成目疾宜預解肝之毒羌活湯十加
青皮柴胡○肺證毒多者必增喘嗽煩渴不止手搦眉目鼻面宜
預解肺之毒瀉白散五十四合其桔湯七加牛旁子天花粉○心

證毒多者必伏不起謔妄飲水煩哭咬牙宜預解心之毒導赤散
三十五 加黃連辰砂○脾證毒多者必成灰白色痒瘍吐利宜預
保養脾胃以解其毒四君子湯二十調元湯十八加白芍藥防風
運翹○腎不見平證耳聾俱熱者死候也

痘瘡主治解表和中解毒三法也解表蕪發散之義使邪氣盡出
於外不使留伏於中如防風白芷荆芥穗升麻葛根柴胡桂枝之
屬和中專主脾胃蕪助血氣使裏氣常實血氣不虧助養痘瘡而
待其成不致痒溺倒陷如黃耆人參白芍藥當歸木香陳皮之屬
解毒只瀉火涼血清氣使毒邪有制不為正害如山豆根大力子
紫草連翹芩連梔子之屬

瘡疹發熱疑似時

傷寒傷食宜辨之

試將解發真良劑

入口能令解却疑

痘疹發熱與傷寒傷食相似疑似之間可以解發之藥服之若是痘證則痘子即出不是痘證則熱退而解矣如證似傷寒者面赤紫肩敗毒散以主之

二附方

證似傷食者面黃香蘇敗毒散主之

始終清便自調佳

便溺阻艱事可嗟

腹脹喘煩多壅遏

急施疎導解留邪

痘瘡始終要小便長而清大便疎而潤謂之裏氣和若有阻艱即毒邪留伏於裏腸胃壅遏不得運化但見少有阻澁須微利之小

便澁者導赤散

三十五

連翹湯

八十八

大便鞭二三日不更衣者

柴胡飲子良

九十九

胆導法

五十一

大小便俱不通者胆導法

五

十一柴胡飲子良

九十九附方

如逡巡隱忍不能早治以致腹脹

滿喘氣煩躁者治無及矣

瘡疹為陽待熱成

微微發熱始和平

假如大熱身猶火

解毒常教小便清

瘡疹屬陽非熱不能成就故治不可盡除其熱但微微發熱不渴大
小便自調此肌表瘡本之熱非裏熱也謂之表裏無邪不可妄治
身熱如火瘡勢稠密其毒必盛宜解毒兼利小便連翹升麻湯

連翹湯

八十八

主之

始終能食最為良

平日其人脾胃強

食少却防中氣弱

淹留引日變瘍瘡

疽瘡始終以脾胃為主故人能飲食者氣血充實自然易壯易醫
食少者起發收醫不能快易治疽之工於食少者必須詳審若平
日能食今因疽出而食頓減或咽痛飢欲食而不能宜解利咽喉
耳枯湯七加牛旁子或咽痛或咽不痛不飢不欲食又看大便何
如大便鞭此賴平日穀氣以為主雖數日不便無妨不可妄補以
增內熱亦不可妄解毒以損脾胃大便一日一行則內之穀氣有
限而氣血易衰須用和中四君子湯二十加炙黃耆木香青皮不
可解毒者脾胃虛也大便瀉則裏虛宜急止其瀉四君子湯二十

耆耆建中湯三十一理中湯三十四並加訶子肉合肉豆蔻九四

或錢氏異攻散四十四益黃散四十五甚則用陳氏木香散

二十五異攻散二十六此二藥太峻非內虛瀉甚不可輕用也若

向能食一旦食減不咽痛但腹中滿或痛此必傷食以養脾九一

百六木香大安丸九十一消導之甚則以丁香脾積丸三十三原

物湯下以微利止復食以四君子湯二十合勻氣散十三或養脾

丸一百六調養之

最宜安靜號和平
表裏無邪志自寧

忽然煩擾宜詳審
外怕神亡轉悶昏

痘疹以安靜為貴飲食坐卧如常此表裏無邪號曰和平忽然煩

癰疽大宜審視瘡執形色如瘡起發光壯不渴大小便通利
癰正發毒邪散佈氣血壅急而痛謂之痛煩不須施治待膿成
化痛止而煩去矣如瘡正色間之不痛但覺心煩不安此內熱也
心惡熱謂之熱煩以導赤散三十五加梔子仁麥門冬或以牛黃
清心丸三十六燈心湯下如瘡紅紫乾燥壯熱口渴狂亂昏悶嚴
語如見鬼狀者退火回生丹主之一百五附方如瘡痒癢此欲陷
也瘡乍見乍隱此有伏也目閉言妄謂之神喪不治

吾邑汪我溪次女乃胡三溪次孫之媳丁卯冬出痘請吾長兄
邦忠醫之起發貫臍時嘿嘿昏睡不來飲食予適過其家聞之
乃謂忠曰此心血不足邪火內熏神昏證也不亟治恐有變命

以龍腦安神丸與服神清氣爽甦醒而安

又程雙泉之孫希文次子辛未春出痘發熱現形時便煩躁謔語雙溪聞吾在縣來告以病證且乞一方予授一方用木通山梔仁麥門冬牛蒡子連翹耳草燈心作引水煎調辰砂末服之連進三劑病退痘出如期收較而安

疳癆方將倒陷時

急馮妙劑強扶持

空中痘出無番次

損處多膿功可施

痘瘡喜厚實堅牢火員飽滿若頂平皮薄色淡忽然癢痒損瘡者此脾胃弱肌肉虛欲變倒陷也宜十全大補湯三十八加防風荆芥穗服之外用陳薰法八十一如痘空中原無痘處復出大小

三作三四番出其破損處復加腫灌成膿能食大便調者
若痒不止皮脫瘡乾或利或大便秘悶亂者此已隔也不可再
治

陷伏須分實與虛

莫於臨證更躊躇

死生倏忽如翻掌

幽谷春回慶有餘

凡痘疹內者不出謂之伏外者復入謂之陷陷伏之證有實有虛
如大熱渴大小便不通煩躁譫語妄有見聞狂亂腹脹者此實也
實者邪氣壅遏侵蝕正氣宜內服百祥丸 五十二 牛李膏 五十三
或宣風散 九十二 事變百祥丸 一百二十六 外用水楊湯 七十五
浴之得利瘡出者佳更以仙聖散 六十二 加味四聖散 六十四 並

加燒人尿調之如因吐瀉不止渴喜飲水腹脹手足冷或寒戰咬

牙者此虛也虛者正氣虛弱不能制伏邪氣令得反覆宜內服

班湯十五合勻氣散十三奪命丹十七甚則陳氏木香散二十五

異攻散二十六外用木楊浴之七十五得泄止瘡出者佳更以

全大補湯三十八加燒人尿調之此上二證並用神應奪命丹

七附方如法施治瘡不出反加煩躁昏不知人者死證也

大抵看痘之法其出欲盡出不盡者伏也其發欲透發不透反乎

塌者倒陷也其收欲淨膿潰皮破收不乾淨者倒靨也陷伏之

謂之逆證非衝擊猛峻之劑安能成起死回生之功哉時醫欲以

尋常之藥治陷伏之病其猶放雀搏鷄驅羊敵虎其弗克也

蘇合命丹十七甚者神應奪命丹主之十七附方如倒靨

氣實者解表內托散一百二十一附方氣虛者調元湯十八加白

芷桂防風當歸主之服藥之後有三驗法原瘡得腫以成膿者一
驗也原瘡已乾別於空中復出一層起發寒膿但如疔收靨者
二驗也不腫不出只變自利下膿血者三驗也有此三驗者吉無
之者凶

四時分治候須明

暑濕風寒不可輕

異氣莫教相觸犯

致令翻變亂其真

古人養生或治病者常順四時之氣謂之勿伐天和如春夏養陽
秋冬養陰飲食起居各有攸宜凡瘡疹發熱之時其初發表解肌

四時各有主方春用羌活湯十夏用五苓散二十八秋用參蘇飲

三冬用五積散八十六四時通用人參敗毒散二又如春肝旺風

木主事調養之法宜四物湯十九加防風黃芩木香青皮羌活以

折風木之勝又以四君子湯二十加白芍藥桂心以補脾之受制

相間服之○夏心旺熱火主事宜黃連解毒湯八十九合天水散

九十四以清熱火之勝又以調元湯十八加麥門冬五味子以補

肺之不足○秋肺旺燥金主事宜瀉白散五十四合甘桔湯七加

牛勞子馬兜苓以散肺中之邪又以四物湯十九去川芎加大麥

門冬天花粉以潤其燥○冬腎旺寒水主事宜五積散八十六以

散表之寒理中湯三十四加黃耆炙木香丁香以勝裏之寒此四

時之治法也○如天有暴風連日不止恐有風邪桂枝葛根湯五

夏盛暑或非時之熱人參白虎湯二十四冬月嚴寒或非時之

寒四君子湯二十加桂枝生姜久雨濕盛五苓散二十八加蒼朮

此四候者必瘡變色有異證可依其法治之苟無他候不可妄治

也惟謹惟慎遠風寒毋令大熱毋令大寒但常和煖更常服蟬退

膏一百五蓋此方能禦風邪辟惡氣透肌快斑疹也房室之中常

燒辟穢香九十三勿得間斷

治痘皆言要補脾

補中有害少人知

一朝陽盛陰先絕

到此臨危悔却遲

痘瘡雖以脾胃為主但謂不可攻擊以損中和之氣然亦不可妄

補而使之太過也若果吐利飲食少者四君子湯二十聖藥也苟
能食大便鞭此裏本實復以四君子與之則為實實陽勝陰虧不
久而生變矣况白木燥津液枯木滲津液氣盛血枯者其貽害豈
小哉吾見世人習用補藥者或增煩躁或成潰爛往往不悟良可
慨夫

痘瘡脉候貴和平

胃氣悠長最要清

弦數浮洪為實候

微沉短瀄是虛因

痘瘡之脉中和安平為貴不可躁疾微小故曰脉靜身涼者生脉
躁身熱者死又陽病得陰脉者死夫四時以胃氣為本胃氣者弦
不弦石不石也故弦數浮洪為太過為實實者邪氣實也沉遲微

瀋為不及為虛虛者正氣虛也皆死候之脉所以人無自氣則死也

痘逆證逆色脉逆

此候未聞人救得

但觀色脉有可為

對病真藥須詳細

治痘之法色脉為本病證為標若痘逆如陷伏之類證逆如煩躁悶亂腹脹足冷之類色逆如氣色昏黯皮肉鰲黑之類脉逆如躁疾鼓搏謂之陽盛陰虛沉微濡弱謂之陰盛陽虛四逆俱全標本同病表裏皆傷不可治也若只痘逆證逆六脉調勻五色明潤者此標病本不病也急治其標以救其本對病之藥良工得之

鄖陽撫治右僉都御史孫公只一女七歲己巳四月初七日發

熱全在幕下見其面赤頤燥知是痘證初八日口角傍便見紅點如蚊跡狀不成顆粒一逆也腰痛腹又痛二逆也昏睡譫語三逆也乾嘔四逆也初九日公見其狀撫膺大慟全以色脉無恙再三慰之不信但垂淚言曰爾痘疹書明言不治何又相誑耶全告曰此病在經絡猶可治也但因中氣又虛不能驅毒外出耳只要保全無事公曰固所願也乃命進藥予用保元湯以補其中氣加羌活防風荆芥柴胡以為發散表邪之用木香山查以為驅逐裏邪之用調辰砂末以為解毒之用初九初十一日連進三劑十三日午時忽然昏暈目閉口禁神色俱變公與夫人皆哭全急告曰此有胃汗來也汗出痘亦隨出謂之胃

痘乃吉兆也須臾視之果得大汗而痘盡以矣復用錢氏異功散加黃耆白芷調理而安公喜謝曰吾為爾刻痘疹書今有用矣

壬申二月朔黃州府王蒸湘一子一歲半出痘請予往治其痘書以備其詳時有董醫在荅曰正月二十七日發熱二十八日現形自額上起今三日矣予思重者一齊湧出額上初出者重三五成叢者重五心俱有者重鎖項者重乃逆痘也及審其証腹脹大而緊腸中汨汨有聲大便如黃金色乃脾敗逆証也因其一子託治甚切設法調治腹脹不減腸鳴如故起發之初心窩中有一痘戴漿者隨即破滅背脊盡成水泡目中淚出兩拳

緊握予甚恐此脾土敗而肝木勝之候也蓋肝為水泡其為變也握不泣而淚出肝絕也自後若作癢痒則劇矣未五日而唇瘡乾黑背瘡盡破診其脉濡弱沉細其脉又逆六日而痒作握頭扭項逆證也且求粥食且急病名除中又逆證也予急進保元湯合桂枝湯調獨聖散服之復見紅點蒸湘喜曰此有生意矣予曰幸以漸出一層小痘則吉只恐膏之將滅也必大明而後滅果紅點復隱加喘而壞痛哉

惟痘形容有數般

上醫臨證盡須諳

慢誇君有如神術

縱療何能得保全

惟痘者乃逆痘中之最甚者也形證不一宜辨之

一痘子初出時面胸手足已見紅點却不起發不成膿水隨即收斂若加悶亂氣喘者即死此內陷證也若無喘煩之證名曰試痘過五七日復發熱出痘者其痘必重

一痘子出現三兩成叢根脚堅硬成塊者此名痘母不治六七日死

一痘子將出身上有紅腫結硬處似癰非癰似癰非癰亦名痘母不治三五日死

一痘子初出便成血泡或是水泡隨即破壞此名爛痘不治二三日死

一痘子出後遍身都是空殼不作膿水者此名空痘不治八九日

死不死者亦終難毒難調

一痘子出現起發之時中有乾墨者此名鬼痘宜用臘脂水塗勿使蔓延若不急治當盛不醫乍起乍塌多作番次而出綿延日久而死

一痘子出現起發之時中間有痛如刀刺者叫哭不止此名痘疔不治五六日死

一痘子起發之時枯燥不潤塌伏不起皮膚皺揭者此名乾痘不治五六日加煩滿喘急而死

一痘子起發之時皮嫩易破摸之濕手者此名濕痘不治六七日痒癢而死

一痘子起發之時瘡色嬌艷皮肉緋紅者此名嫩痘八九日後不能成痂痒瀉而死

一痘子起發養漿之時瘡頭有孔漿水漏出者此名漏瘡不治五六日後痒瀉而死

一痘子膿水將成之時其瘡自破有孔而深此名倒陷不治

一痘子將靨之時不能成痂皮脫肉黑者此名倒靨不治

一痘子收靨之初不能成痂皮肉潰爛膿水淋漓者此名痘癰能食則生不能食則死

醫心法卷之三

發熱證治歌括

凡一十九首

痘疹發熱似傷寒

證治分門不一般

疎解透肌斑毒出

陰陽和暢少留連

傷風寒膜理閉密陽氣拂鬱而發熱其證惡寒畏人怕露頭面以
溫熱之劑發之邪氣去陽氣舒暢汗出而解再不傳入於裏為痞
滿燥實也痘疹毒發於裏陽氣熏蒸而熱其證惡熱喜露頭面以
溫涼之劑解之使榮衛疎通陰陽和暢毒由筋骨臟腑而達於肌
肉皮毛漸化而解之不留連鬱遏於裏也

吾邑大尹雲閣朱公一子九歲庚申三月發熱嘔吐召全視之

告曰痘證也公曰不然昔在四川任所出過乃指面上痘跡示之全曰此水痘癍跡非正痘癍也公堅執是傷食證不是痘證全辨之曰瘡疹發熱與傷寒傷食相似傷寒發熱則面紅手足微溫傷食發熱則面黃白手足壯熱痘疹發熱男則面黃體重女則面赤顯燥其足俱涼今公子身熱面黃足涼痘證諦也經云痘乃胎毒五臟各具一證發熱呵欠驚悸心也項急頓悶肝也咳嗽噴嚏肺也吐瀉昏瞶脾也耳涼骹涼足涼腎也以此論之乃痘證非傷食也公又駁曰未見五臟諸證只嘔吐足涼且在蜀中出過痘跡可驗是傷食證非痘也全曰公子脾胃素弱痘毒乘虛故發在脾但見嘔吐一證熱纔三日姑俟明旦無證

次日以燈視之皮下隱隱紅點而唇邊已報痘矣公惟一子
甚憂懼全告曰吉顆粒分明部位正當此順痘也公問宜服何
藥全曰痘瘡無病不宜服藥但適其寒溫調其飲食期十三日
而安公喜親書儒醫二字立扁謝之

發表時師少定方

古人專主葛根湯

能通權變知增損

何必多方立紀綱

古人治痘以葛根湯為主後世好奇多立方法法愈多而治愈難
矣苟能變通自發表熱以至收靨葛根湯皆可增損用之不特發表
解肌而已今葛根湯一為主治隨證立增損法于後

○初發熱解表加柴胡羌活白芷桔梗防風○口乾渴內熱也加

葛粉天花粉麥門冬○自利加條實黃芩生用○嘔吐加半夏
生姜○腹中痛加木香青皮枳殼山楂肉○腰疼加獨活北細
辛○頭疼加羌活藁本蔓荊子○驚搐加木通生地黃熾心○
小便少加木通車前子瞿麥○大便秘加大黃○衄血加山梔
仁玄參生地黃○發熱三四日熱甚不減加解毒藥大力子連
翹紫草桔梗○瘡不出加防風蟬蛻荊芥穗紅花子○眼痛加
密蒙花柴胡龍膽草○瘡出後太稠密加人參當歸木香紫草
大力子防風桔梗○咽痛加桔梗連翹○瘡乾或帶紫或色大
赤者血熱也加當歸稍生地黃紅花地骨皮牡丹皮○瘡灰白
色平陷者氣虛也加人參白朮防風木香官桂○手足痿不起

脾胃不足也加防風官桂人參黃耆○瘡太密起發不透又渴者此津液不足加人參麥門冬天花粉○泄瀉者黃連也加人參白朮訶子白茯苓○瘡不着痂者濕熱也加黃耆防風官桂白芷

解表升麻湯最良

紅斑雖見飲何妨

時師膠柱無通變

纔見紅斑不敢嘗

古人謂但見紅點便不可服升麻葛根湯恐發得表虛也此蓋為痘疎毒少者言後人不達立言之旨遽謂凡出痘子纔見紅點真不可服殊不知升麻葛根湯四味乃發表解毒疎通血氣升降陰陽之劑痘出太密正宜常服以解之令陷者升之燥者潤之鬱者

疎之過者平之陰精不衰而陽毒不亢也苟謂痘疎毒少者雖他藥不可服況眉根湯乎

瘡疹未形先發熱

吉凶輕重如何別

熱微毒少吉堪言

熱甚毒多凶可決

瘡疹發熱熱氣微者其毒必少痘出自疎易發易壓不須服藥熱氣甚者其毒必多痘出自密難發難壓且多他變宜預解之宜連

翹升麻湯

六或如聖湯

一百四

解毒快班湯

一百四

並合代天宣化

九十二主之○或有熱微痘出反密者其人必口渴渴唇焦裂小

便赤少大便秘身雖不大熱却蒸蒸然此毒深熱亦深故表不大

熱而裏熱也宜急解之柴胡飲下二十○或有熱甚痘出反疎者

人必不渴唇潤目中無赤脉大小便調身雖大熱但焮焮然此
毒淺執亦淺故表執裏氣和也只以升麻葛根湯一

發執天渴執在中

舌燥唇焦毒火攻

莫比尋常此小渴

養陰解毒有神功

此心經出痘證也痘疹發執有不渴者執在表不在裏也有小渴
者痘疹之執生於內心主執心移執於肺故渴此常候耳切不可
與冷水紅柿西瓜之屬恐冷傷脾損肺但與陳廬采作湯飲之若
大渴噬乾唇焦舌燥此心火大炎腎水不升毒火妄蒸血枯液耗
宜急解之葛根解毒湯二十
大劑飲之不止更加黃連以瀉心火
之有餘黃和知母以滋腎水之不足舌潤則生舌如芒刺則死蓋

舌乃心之苗少陰之脉榮於舌也○如發熱自利而渴者此津液不足也黃芩湯四十加入參白朮麥門冬主之

熱時腹痛陣難禁

臟腑之中毒氣侵

發散疎通如痛減

切妨陷伏變非輕

此脾經出痘證也訣云發熱肚中痛斑痧腹內攻發多防不透發少更防癰可見痧疹腹痛乃惡候也凡發熱腹中便痛者此毒氣內攻也宜發表疎裏桂枝大黃湯主之二十若原無腹痛發熱二三日後大便不通而痛者此燥屎與毒相併而痛也膽導法五十宣風散九十擇而用之有譫妄狂亂者內服退火回生丹百外用膽導法五十原無腹痛或因飲冷水而痛者此冷痛也理中湯

三十加桂心或因多食而痛者此食積痛也微則木香大安丸

一甚則承氣湯二十丁香脾積丸三十原物湯已上諸可下者若

脾胃素弱之人不可與下反傷脾胃宜補中順氣湯主之附方一

原無腹痛自利後痛者此虛痛也黃耆建中湯加木香青皮發熱

自利又腹痛者此亦毒也黃芩湯一四十加木香青皮或化毒湯主

之三十如瘡乍出乍隱此伏也防風通聖散四瘡出盡者再以神

應奪命丹十七大發之瘡不出者勿治

黃岡縣索希文在吾縣作掾庚申一子十三歲染痘發熱腹中

痛煩躁而渴先請萬世喬作傷食治熱不除腹痛轉甚復請予

治予曰此痘也腹痛者毒氣內攻也煩躁而渴者神不得安津

液乾也法當鮮毒耗裏不可緩也世喬堅執為傷食證五日後其痘一齊湧出未及起發乾枯內陷而卒其母泣曰悔不用密齋先生之言

發熱腰疼最可訝

膀胱傳腎變凶邪

急宜發散陰中火

莫待流殃却痛嗟

此腎與膀胱二經出痘證也痘瘡初發熱便腰痛其後多不可治之證蓋由太陽膀胱而傳小腸乃自下而上自內而外為順今由膀胱傳入於腎乃陷於至陰之下而不得升伏於骨髓之中而不能出故瘡疹歸腎者死但查腰痛宜急發散令毒化解復出於太陽而行陽道也人參敗毒散二或五苓散加獨活細辛主之二十

英山縣一富家子年十六患痘發熱惡寒米請予治予問曾
配否曰未也乃用人參敗毒散連進二服痛止痘出而安若曾
有房室者不可治也

腰痛雖云大不祥

女輕男重更消詳

未婚可許真元固

已娶堪憂相火狂

經曰腰者腎之府也乃人身之樞紐諸骨之根抵痘疹腰痛最為
大忌女子抱陰而生其中有陽男子抱陽而生其中有陰陽道常
饒陰道常乏故男重女輕也男子未婚者腎中之真陰未損已娶
者則陰水虧而陽火熾矣此又男子輕重吉凶之辨不可不知

惟有班疹能作搗

要識病原屬肝木

木能勝脾又歸心

風火相爭多不足

此肝經出痘瘡也班疹發熱之初多有作搐者蓋疹為脾所生脾
虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動於心神心喜為熱神氣不
安因搐成癇班子為心所生心生熱則生風上屬於肝二臟相
搏風火相爭故發搐也以導赤散_{三十}加神砂未與瀉青丸_{一百}
合而治之如再不止小便利者可治以導赤散_{三十}送下牛黃清
心丸_{三十}或粉紅丸_{一百}小便不利者勿治其有不作搐只多叫
哭者肝熱也目必直視瀉青丸_{一百}目不直視煩渴多哭者心熱
也導赤散_{三十}加黃連梔子仁主之

本邑胡元溪惟一子甚珍愛之未出痘託予調護之心甚切予

嘗之曰令嗣五岳端立三關明潤骨堅肉實神俊氣清乃壽相也出痘必踈壬寅五月末旬發熱作搐元溪夫婦憂惶無措予曰此佳兆也以辰砂散投之搐止痘出予又曰凡痘起脈未有頭面不腫者此痘顆粒小必不大腫面貌如常期十一日而安元溪舉手加額曰公之福也

予次男邦孝辛卯春方四歲發熱卒驚而絕其母大哭予曰勿惶此痘疹也乃指合谷得匙與道赤散瀉青丸一服而搐止痘出甚密幸無他病十三日而靨予時在制中服滿起復同輩阻陷乃趨崔宗師至棗陽訴辨徃反半月抵家又出疹予完矣

發熱吐利如併作

上下毒出無壅遏

三焦火邪熱中求

日久不休脾胃弱

此脾胃二經出痘證也瘡疹發熱吐利非寒證經曰諸嘔吐暴注皆屬於熱三焦者水穀傳化之道路為熱所迫則傳送失常吐利併作上焦多吐下焦多利中焦吐利俱多不須驟止吐利中有噤通之義邪氣上下得出無壅遏也如欲止之自利者黃芩湯四十吐利者黃芩加半夏湯四十吐者茱萸散四十橘皮湯四十更詳審吐利所出之物如吐酸水者利色黃或青綠者其氣臭者皆熱也若吐清涎之水利下清白不臭未可作熱治之乃內虛也四君子湯加訶子肉二十益黃散四十利久不止四君子湯二十送下肉豆蔻丸四十三

吾邑胡玉峯第三子方二歲庚申四月染痘自利三日不止
予治之彼欲進理中湯加訶子肉豆蔻予曰不可此協熱利也
宜用黃芩芍藥湯但觀其形色利當自止不必服藥次日痘出
利果止

一小兒發熱時自利清水大孔如竹同狀清水流出逆證也予
思乃火甚於內肺金不行收令也以黃芩芍藥湯加烏梅一服
而利止

發熱譫妄如見鬼

神識不清毒在裏

鎮神解毒以平期

一向不休病不起

此純陽無陰之證初發熱便妄有所見聞妄言如見鬼狀此為惡

候蓋毒攻於裏心志昏惑神識不清而然况小兒神氣怯弱鬼魅
易侵又厲鬼常乘疫氣而行乘人之虛而疰之故凡痘疹妄見妄
聞妄言如見鬼者不可治也須審發於何臟如目直視手尋衣領
亂拾物此發於肝為亡魂悶乱喘促手指眉目鼻面此發於肺為
亡魄上竄咬牙多叫哭驚悸或不能言此發於心為喪神困睡手
足痠癢不思飲食此發於脾為失意目無精光畏明欲墜下而縮
身此發於腎為失志故曰真臟見者不治

或發熱時無此證因大便秘結却有之此內熱也先以三黃丸入

胆道法

五十一

鮮利其熱後以導赤散

五十三

送下牛黃清心丸

六十三

或粉紅丸十一以鎮其神病已者可治連作不愈者勿治

晉邑胡三溪有子丙午生者己酉冬染痘發熱時常以手自掩其面其身下縮頻呼曰我怕若有所見者請予視之予曰遺證也經曰腎敗者失志目中見鬼死不治錢氏云腎病則下竅此痘發於腎不可為也果然

一婦人年二十餘發熱五日痘不出常走起摸壁或摸牀昏不知人口中喃喃語不休請予視之曰死證也此吾蘄水表弟婦○本邑周璜吾慝友也長子年十三庚子冬染痘發熱五日痘不出發狂譫語請予治之予往見其族兄周尚貴在亦明醫也乃問曾服藥否曰連進保元湯三劑矣予曰誤矣犯實實之戒也凡治痘者發熱之初驚者平之渴者潤之吐利者和之便秘者

利之熱盛者解之如無他證不須服藥今觀此子元氣素厚飲食素強乃以保元湯助火為邪毒氣鬱遏至於狂妄熱已劇者宜急下之與三黃湯得利狂止痘出至十七日而靨

蘄水縣北汪沙溪家癸丑年出痘敬請魯家湖黑神降童云爾家十八人有六人不可救也初出痘一婢死亟請予往又一婢發熱昏昧裸體頗狂予見之曰熱劇矣當速解之沙溪夫婦曰專為吾孫請先生來非為此賤婢也且神言有不吉者六人數亦定矣予曰人有賤貴醫無分別楊寶救雀宋郊渡蟻況於人乎如吾之心所治悉活神言不足信也乃作三黃湯大劑與之得利熱減

痘出而安其後一十七人吾悉活之

身上蒸人手足厥

曾多吐利脾虛怯

補中發表要煎行

莫何人前浪饒舌

此純陰無陽之證痘瘡發熱手足却宜和緩雖云足屬腎要涼
非冷也只與常人同遍身皆熱而此同常人故稱涼亦和緩之意
非真冷也若手足冷由其人曾多吐瀉脾臟虛怯脾主四肢所以
冷冷為惡候不可單用發表反損脾胃宜和中發表兼用痘出以
脾胃為主又宜急與大作湯以飲之不可因循空談廢事也先以
黃耆建中湯三十加防風羌活或四君子湯二十加黃耆桂枝防
風以發之發後以四君子湯二十加黃耆白芍藥當歸桂心以補
脾胃養氣血而助痘瘡之成就也

發熱之時血妄行

不知何道血先奔

但從鼻出宜涼解

別道來時可痛心

人身之血不可妄動痘疹發熱有失血者由毒火壅遏於裏煎熬薰灼迫血妄行血亦隨火而動但從鼻出者此火刑於肺鼻為肺之竅宜瀉火涼血清肺以玄參地黃湯六十調薊金末加茅根自然汁磨京墨汁飲之衄止者佳衄出不已者勿治若從口出者從大小便出者皆卒死之候

予義女婿林霄年二十餘染痘初發熱小便下血予聞之嘆曰不可救也或問其故予曰昔乙未春蘄水桃樹圪徐宅出痘死者十八人皆小便出血故知不可救也果三日而卒

晝夜如蒸熱不已

消詳內外分調理

假如咽喉食難嘗

急解咽喉無後悔

乍涼乍熱痘疹常候若遍身如火晝夜不休此心火亢甚脾土益燥為失其常宜消詳表裏證候以施治也如口燥渴目赤唇焦大小便不利此表裏俱熱也雙解散四柴胡飲子附方九十九胆導法五一如咽喉痛甘桔湯七加牛旁子或射干梔子湯六十加桔梗使咽喉爽快胸膈開豁失今不治他日咽喉閉塞水入則噎穀入則嘔暴啞失音悔之無及

發熱渾身汗熱上

陰陽和暢宜沾濕

熱從汗成毒從出

汗泄不休須早治

痘疹發熱有自汗者此榮衛氣和腠理疎通以熱上然身常潤濕
為貴蓋熱以汗成而無拂鬱毒從汗出而無壅遏也不須治之若
汗大出則陽氣暴泄衛氣反弱痘必難發難壓宜急止之調元湯
十八 聖藥也熱甚汗泄者當歸六黃湯主之 六十八

壯熱惡寒形似瘡

邪正交爭榮衛弱

莫將寒戰妄猜疑

發熱何曾聞此惡

如初發熱時時惡寒身振振掣動如瘡之狀其人衛氣素虛榮血
亦弱不能逼毒快出使毒邪留連於經絡之中欲出不出與正相
爭故振振者火之象也以柴葛桂枝湯 八十五 加黃耆主之瘡也
即愈不可錯認作寒戰妄投陳氏辛熱之劑以誤人也

吾長孫祖善乃邦孝長子方二歲染痘發熱三日內忽寒戰似
瘧孝泣曰死證也予笑曰爾為醫救病如稍工駕舟渡人忽忽
遇風浪自先荒亂何以渡人哉此元氣充盛毒氣微少邪不勝
正故作寒戰而退試觀其痘必少也果只出五七粒七日而安

發熱之初便咬牙

心肝熱壅勢堪望

早分形證施方法

莫向東風恨落花

痘疹咬牙乃惡候也如發熱之初便咬牙者此與痒癢吐瀉脾胃
弱者不同須審形證分治之若多欠咬牙頓悶者肝臟風熱也
活湯 目上窠咬牙者心臟熱也導赤散 十五 不可妄用陳氏
辛熱之劑

胡三溪一子戊申生者已酉冬出痘初發熱便咬牙憂上有聲精神昏瞶予見之嘆曰逆證也乃腎虛證蓋腎主骨齒者骨之餘腎水不足則毒火無制火氣煽動故上下相戛而有聲陳氏所謂齒稿者是也果卒

發熱之時喘息類

喉中涎響勢堪驚

急宜解散真高火

勿使炎威燄肺金

此肺經出痘證也經曰臟真高於肺又曰諸氣逆喘急皆屬於火如發熱之初便喘急氣逆喉中涎響此惡候也故云喘無善病此毒火內蒸上熏於肺肺焦葉舉所以喘息而涎響也火鬱則發之宜清金散火湯主之

六十七
附方

若眼閉口張有息足冷者不治

家店程旋溪次男未滿一週時值家中出痘聞音
彼地蔡三詣予視之蓋預防求安之意予見此兒多笑知其心
火有餘乃令蔡朝衣用黃連一錢山梔仁七分辰砂五分水搗
丸服之三日後笑漸少時辛未三月十九日也二十一日發熱
忽作喘喉中涎響汨汨有聲旋溪驚憂然有吾在不甚荒也予
曰此肺熱證幸不有息足冷乃作清金散火湯一劑而減半再
劑而喘定

未發痘瘡先發癰

根窠堅硬色鮮紅

此名痘母不輕視

縱有靈丹也不中

凡發熱三五日內痘形未報胸背手足先有團聚成塊者堅硬紅

三十七
附方

腫似癰非癰此名痘母乃逆證也十發九死真人解毒湯以主之
麻城縣新店周愚齋長子之媳寡惟一女劉安峯之外甥女也
癸亥春出痘來請予治予問其狀請者曰發熱五日餘未見痘
出但背上發一腫毒予曰不可治也非癰乃痘母也汝當亟
早辦後事期三日後有變果卒

發熱時辨生死訣

一發熱三日之內用紅紙條蘸麻油點火照心窩間若有一塊紅
者或遍身有成塊紅者八九日後決死勿治

一發熱三日之內遍身一齊出紅點如蚕種樣摸之不得手者

死勿治

一發熱三日之內腹內大痛又腰痛及痘出乾枯壅痛不止者決死勿治

一發熱三日之內面上有一片紅者色如臙脂六日後決死勿治

一發熱三日之內不問口鼻大小便但失血者三日後決死勿治

一發熱三日之內妄見妄語昏不知人者三日後決死勿治

一發熱三日之內腹脹而痛大吐不止者三日後決死勿治

一發熱三日之內其熱忽退煩躁悶亂坐卧不安外雖清涼內却

熱也若見悶亂腹脹手足氣喘者即死勿治